

Symposium 17

Le TDAH en tant que problème sanitaire et social

Présidente : Rita Sferrazza

Le TDAH un problème diagnostique et médico-social

Lors de la dernière décennie, l'extension dans notre pays des critères diagnostiques du DSM s'est accompagné d'un accroissement significatif des chiffres d'incidence et de prévalence de ce trouble. La prescription d'un psychostimulant (le méthylphénidate) est devenu le traitement presque exclusif de la grande majorité des cas. Les enfants hyperactifs et impulsifs, auparavant tributaires de plusieurs diagnostics, sont maintenant inclus de manière systématique sous le diagnostic unique de TDAH, émis par d'autres spécialistes, médecins et non médecins, après des observations rapides et insuffisantes. Cette situation oblige les responsables de la santé publique à étudier les facteurs en cause dans cette «épidémie» et à proposer de mesures correctrices qui sont discutées dans ce travail

Alberto LASA

Symposium 17

Le TDAH en tant que problème sanitaire et social

Présidente : Rita Sferrazza

Le diagnostic de THADA semble constituer dans certains pays une vraie épidémie, menant à un usage indiscriminé et abusif des traitements médicamenteux, ce qui configure un sérieux problème de santé publique.

Cette croissance exponentielle du diagnostic de THADA et de la consommation de psychotropes devrait obliger les autorités publiques à essayer de développer des mesures visant aussi bien la compréhension de ce phénomène que sa prévention.

Etrangement nous assistons, notamment au Portugal, à l'acceptation favorable de cette réalité, ce qui amène au transfert de millions d'euros de ressources fragilisée du système national de santé au bénéfice des coffres des multinationales de l'industrie pharmaceutique.

Il incombe aux professionnels de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent de dénoncer cette situation, revendiquer des politiques d'investigation de ce phénomène et exiger que des mesures de prévention soient appliquées en conséquence.

L'adoption de politiques de protection sociale de la famille ainsi que la correction de certaines pratiques éducatives pourront être plus efficaces à moyen terme que l'usage de substances psychostimulantes.

Augusto CARREIRA

Chef de Service de Pédopsychiatrie, Lisbonne

Symposium 17

Le TDAH en tant que problème sanitaire et social

Présidente : Rita Sferrazza

Trouble hyperactif et pathologie limite de l'enfant

Vis-à-vis de l'énorme intérêt de la part des médias pour le diagnostic de TDAH et de sa prétendue diffusion, sans doute excessive, dans la population générale, il nous faut rappeler les nombreux points de contact entre la description des cas qui sont souvent classés sous ce code à partir de la simple observation du comportement des enfants et la clinique des pathologies limites de l'enfant, telle qu'elle a été décrite par Roger Misès (et qui a, selon nous, une grande valeur heuristique).

En effet, en dehors de toute discussion sur l'étiologie des troubles et sur leurs traitements symptomatiques, en analysant seulement les modalités spécifiques de fonctionnement de la pensée et de son organisation, l'évolution pulsionnelle, les mécanismes de défense, les relations d'objet, la transitionnalité, on pourra aider chaque sujet à se situer par rapport au monde.

Lenio RIZZO

Symposium 17

Le TDAH en tant que problème sanitaire et social

Présidente : Rita Sferrazza

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), est une entité clinique remise en cause par sa description purement comportementale. Les grands écarts entre les différents pays dans l'évaluation de la prévalence du syndrome , basée sur des études épidémiologiques , prouve que les efforts des systèmes de classification contemporains a proposer des critères diagnostiques univoques n' ont pas aboutit.

La plupart des recherches, particulièrement en milieu Anglo-Saxons se font à partir de concepts purement descriptifs et il ne semble pas qu'ils tiennent compte de l'histoire individuelle de chaque enfant, ni des relations avec son environnement.

L'étude psychopathologique vient alors compléter cette lacune et donner un sens aux symptômes psychomoteurs.

En Grèce, pays méditerranéen, ou on accepte plus facilement un enfant désobéissant et turbulent, le taux des cas diagnostiqués est relativement bas. Actuellement on constate une relative augmentation qui pourrait être attribuée aux changements radicaux de la vie familiale, conséquence de la crise économique qui frappe le pays depuis quelques années.

Hélène LAZARATOU
elazar@med.uoa.gr

**Professeur Associée de Psychiatrie Infantile,
Ecole de Médecine, Université d'Athènes**

Symposium 17

Le TDAH en tant que problème sanitaire et social

Présidente : Rita Sferrazza

Prescription de psychotropes chez l'enfant: usage, abus et aberrations.

L'enfant possède une plasticité cérébrale impressionnante qui permet la mise en place de circuits cérébraux et de connexions neuronales, ce qui permet à son tour le développement de ses compétences cognitives et l'acquisition de pattern comportementaux, adéquats ou inadéquats.

Les psychotropes quant à eux, agissent sur des neurotransmetteurs, et n'ont jamais mis de nouveaux circuits neuronaux en place.

Cette réflexion servira de base à un plaidoyer pour une approche psycho-éducative des troubles du comportement et à un réquisitoire contre les abus de prescription de neuroleptiques, dont les effets secondaires sur le corps de l'enfant sont souvent spectaculairement dangereux.

Une hypothèse concernant cette dérive sera illustrée par le récit de la naissance de deux diagnostics : les enfants sorciers en Afrique et le TDAH en Occident.

Philippe KINOO

philippe.kinoo@uclouvain.be

Université Catholique de Louvain